Введение

Методические указания посвящены вопросам изучения и практического применения теории функции двух переменных. Каждый параграф соответствует одному практическому занятию по данной теме.

Цель указаний – облегчить самостоятельную работу студентов в аудитории и при выполнении домашних заданий.

§1 Область определения. Изображение функций двух переменных при помощи линий уровня

Областью определения (ОО) функции двух переменных $z = f(x, y)$ называется множество таких точек координатной плоскости XU , для которых эта формула имеет смысл и результатом каждой операции, указанной в формуле является действительное число.

Будем называть *ϵ -окрестностью* точки $Q_0(x_0, y_0)$ круг с центром в этой точке Q_0 и радиусом ϵ .

Линии, образованные множеством таких точек, в любой ϵ -окрестности которых присутствуют как точки принадлежащие области определения, так и не принадлежащие области определения, будем называть границей области определения.

При построении области определения функции двух переменных на координатной плоскости XU необходимо придерживаться следующих правил.

- Область определения заштриховывается.
- Если требуется показать, что некоторая точка принадлежит области определения, то эта точка закрашивается.
- Если требуется показать, что некоторая точка не принадлежит области определения, то эта точка выкалывается (обводится окружностью).
- Если часть границы области определения принадлежит области определения, то она изображается сплошной линией.
- Если часть границы области определения не принадлежит области определения, то она изображается штриховой линией.

Линией уровня (c - уровнем) функции двух переменных $z = f(x, y)$ называется множество точек координатной плоскости XY , удовлетворяющих условию $c = f(x, y)$.

Уровни функции трёх переменных называют *поверхностями уровня*.

Пример 1. Найти область определения и линии уровня функции, заданной формулой

$$z = \sqrt{\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1}}$$

Решение. Найдём ОО. Функция определена в тех и только тех точках (x, y) плоскости, координаты которых удовлетворяют условиям

$$\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1} \geq 0 \text{ и } x^2 + y^2 - 1 \neq 0.$$

Эти условия равносильны двум системам неравенств:

$$\begin{cases} y \geq 0 \\ x^2 + y^2 > 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} y \leq 0 \\ x^2 + y^2 < 1 \end{cases}$$

Первой системе неравенств удовлетворяют координаты всех точек, расположенных в полуплоскости $y \geq 0$ и вне окружности радиуса 1 с центром в начале координат. Второй системе удовлетворяют все точки плоскости, лежащие в полуплоскости $y \leq 0$ и внутри окружности радиуса 1 с центром в начале координат (рис. 1).

Для нахождения линий уровня функции надо найти множество точек плоскости, координаты x, y которых удовлетворяют уравнению $\sqrt{2y/(x^2 + y^2 - 1)} = c$.

Если $c < 0$, то линией уровня функции является пустое множество; если $c = 0$, то линией уровня функции будет, очевидно, множество всех точек прямой $y = 0$ за исключением двух точек $(\pm 1, 0)$, не входящих в область определения функции. В случае $(c > 0)$, преобразуя исходное уравнение, получаем

$$\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1} = c^2, \quad x^2 + y^2 - \frac{2}{c^2}y = 1, \quad x^2 + \left(y - \frac{1}{c^2}\right)^2 = 1 + \frac{1}{c^4}$$

Следовательно, линией уровня функции при $c > 0$ является окружность радиуса $\sqrt{1 + 1/c^4}$ с центром в точке $(0; 1/c^2)$ за исключением двух точек $(\pm 1; 0)$, не принадлежащих ОО.

Рис. 1

1.1 Изобразить на координатной плоскости XU области определения функций двух переменных, заданных формулами:

$$1) z = \sqrt{x-y} + 5\sqrt{x+y}.$$

$$2) z = \arcsin(x+y).$$

$$3) z = \frac{1}{x+y}.$$

$$4) z = \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

$$5) z = \frac{1}{1-y^2}.$$

$$6) z = \frac{1}{\sqrt{9-x^2-y^2}}.$$

$$7) z = \arcsin(x^2 + y^2).$$

$$8) z = 6\arctg(x^2 + y^2).$$

$$9) z = \ln(x+y).$$

$$10) z = \ln(x^2 + y^2).$$

$$11) z = \frac{1}{\ln(x^2 + y^2)}.$$

$$12) z = \frac{1}{\ln(x) + 7\ln(y)}.$$

$$13) z = \ln(4x^2 - y^2).$$

$$14) z = \ln(x^2 + y^2 - 1).$$

$$15) z = \sqrt{1-x}.$$

$$16) z = \sqrt{9-x^2-y^2}.$$

$$17) z = \sqrt{1-|x|-|y|}.$$

$$18) z = \sqrt{1-|y|}.$$

$$19) z = \frac{x-y}{|x|-|y|}.$$

$$20) z = \ln(1-|x|+|y|).$$

1.2 Изобразить на координатной плоскости XU линии уровня следующих функций:

1) $z = \frac{1}{x^2 + y^2}$.

2) $z = \frac{x}{y}$.

3) $z = x + y$.

4) $z = x - y$.

5) $z = x^2 + y^2$

6) $z = xy$

7) $z = \sin(x)$.

8) $z = \sqrt{y}$.

9) $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$.

10) $z = \frac{1}{\sqrt{x+y}}$.

11) $z = \frac{1}{x^2 - y^2}$.

12) $z = |x| + |y|$.

13) $z = |x + y|$.

14) $z = |x - y|$.

15) $z = \frac{x}{x+y}$.

16) $z = \frac{x+y}{x}$.

17) $z = \ln(1 - x^2 - y^2)$.

18) $z = \ln(1 - |x| - |y|)$.

19) $z = \frac{1}{\arcsin(x^2 + y^2)}$.

20) $z = \frac{1}{\text{arctg}(x^2 + y^2)}$.

§2 Частные производные первого порядка, градиент, производная по направлению

Рассмотрим функцию двух переменных $z = f(x, y)$. Для вычисления частной производной $\frac{\partial f}{\partial x}$ обычно пользуются обычными формулами и правилами дифференцирования функции одной переменной, **мысленно** считая y постоянной, а для вычисления частной производной $\frac{\partial f}{\partial y}$ — считая x постоянной. Для частных производных первого порядка также используются обозначения $f_x \equiv \frac{\partial f}{\partial x}$, $f_y \equiv \frac{\partial f}{\partial y}$.

Градиентом функции $z = f(x, y)$ называется вектор $\left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\}$. Этот вектор обозначается $grad f$.

Свойства градиента.

- Градиент направлен в сторону возрастания функции.
- Градиент перпендикулярен линии уровня, проходящей через точку, в которой этот градиент вычисляется.
- В точке экстремума (см. §9) градиент равен нулевому вектору, или не существует.
- В точке условного экстремума (см. §10) градиент перпендикулярен кривой, задаваемой уравнением связи.

Пусть задан вектор $\dot{\mathbf{I}} = \{m, n\}$. Обозначим $\cos a, \cos b$ - косинусы углов, образованных вектором $\dot{\mathbf{I}}$ с осями координат (*направляющие косинусы*). Производная функции $z = f(x, y)$ в точке (x_0, y_0) по направлению вектора $\dot{\mathbf{I}}$ вычисляется по любой из формул:

$$\frac{\partial f}{\partial \dot{\mathbf{I}}} = grad f \cdot \frac{\dot{\mathbf{I}}}{|\dot{\mathbf{I}}|}, \quad \frac{\partial f}{\partial \dot{\mathbf{I}}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos a + \frac{\partial f}{\partial y} \cos b$$

или

$$\frac{\partial f}{\partial \dot{\mathbf{I}}} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{m}{\sqrt{m^2 + n^2}} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{n}{\sqrt{m^2 + n^2}}.$$

Производную функции f по направлению вектора $\dot{\mathbf{I}}$ обозначают $\frac{\partial f}{\partial \dot{\mathbf{I}}}$.

2.1 Вычислить частные производные $\frac{\partial f}{\partial x}$ и $\frac{\partial f}{\partial y}$

следующих функций:

1) $z = \sin(x + y)$.

2) $z = \ln(x^2 + y^2)$.

3) $z = \arcsin(xy)$.

4) $z = \sqrt{1 + xy}$.

$$5) z = 3 \operatorname{tg}\left(\frac{x}{y}\right) + x - y^2.$$

$$6) z = 8 \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x}\right) + \sqrt{x}.$$

$$7) z = 6 \frac{x+y}{x-y} - y^5.$$

$$8) z = 9 \arccos\left(1 - \frac{x}{y}\right) + yx^2.$$

$$9) z = \ln(x+y)\sqrt{x-y}.$$

$$10) z = \sin(xy^3) * \operatorname{tg}(x+y).$$

$$11) z = \frac{\sin(3x^2 + y)}{\operatorname{tg}(xy)}.$$

$$12) z = \frac{e^{-x}}{\arcsin(x-xy)}.$$

$$13) z = \cos\left(\frac{x^2}{x-y}\right) + xy - y.$$

$$14) z = \frac{\operatorname{tg}(x-y^5)}{\operatorname{ctg}(xy-1)} - e^{3x^2}.$$

2.2 Вычислите градиент следующих функций:

$$1) z = \frac{x-1}{y+x}.$$

$$2) z = \frac{xy-1}{x+\ln|ey|}.$$

$$3) z = \frac{x^3 - xy}{x+y}.$$

$$4) z = \frac{x + \sqrt{x+1}}{y-1}.$$

$$5) z = \frac{xy + \sqrt{1+xy}}{1-x^2+y}.$$

$$6) z = \frac{x^2-1}{xy+1}.$$

$$7) z = \frac{e^{-x}+3}{y-x}.$$

$$8) z = x^2\sqrt{x+y}.$$

$$9) z = (x-y)\sqrt{x+y}.$$

$$10) z = (x+y^2)\sin(px).$$

2.3 Вычислите градиент функций из упражнения 2.2 в указанных точках. Номера функций (из 2.2) соответствуют номерам точек (из 2.3).

$$1)(1,2); 2) (2,1); 3) (1,5); 4) (3,2); 5) (2,4); 6) (3,-1);$$

$$7) (0,-2); 8) (5,4); 9) (4,5); 10) (0.5,2).$$

2.4 Вычислите производные по направлению. Номера координат векторов $\dot{\mathbf{i}}$ (из 2.4) соответствуют номерам точек (из 2.3) и номерам функций (из 2.1).

$$1) \dot{\mathbf{i}} = (1,5); 2) \dot{\mathbf{i}} = (-1,5); 3) \dot{\mathbf{i}} = (1,-5); 4) \dot{\mathbf{i}} = (2,3);$$

- 5) $\dot{\mathbf{i}} = (1, -3)$; 6) $\dot{\mathbf{i}} = (-2, -8)$; 7) $\dot{\mathbf{i}} = (-2, 1)$; 8) $\dot{\mathbf{i}} = (1, 6)$;
 9) $\dot{\mathbf{i}} = (1, 0)$; 10) $\dot{\mathbf{i}} = (0, 1)$.

§3 Частные производные высших порядков.

Смешанные частные производные. Оператор Лапласа.

Уравнение Лапласа. Уравнение Пуассона

Частной производной порядка m , называют частную производную первого порядка, от любой частной производной порядка $m-1$.

Таким образом, по определению получим:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}; \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}.$$

Частную производную по различным переменным называют *смешанной частной производной*:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{yx}; \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}.$$

Оператором Лапласа от некоторой функции f называется соотношение

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Оператор Лапласа от функции f обозначается $\nabla^2 f$.

Пусть задана некоторая функция $g(x, y)$. Тогда уравнение

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = g \quad (\text{или } \nabla^2 f = g),$$

относительно неизвестной функции $f(x, y)$ называется *уравнением Пуассона*. Для того чтобы решить уравнение Пуассона, недостаточно знать одну только функцию g

(нужны граничные условия, например Коши). Граничные условия Коши состоят в том, что задаётся значение функции на границе области, в которой требуется решить уравнение Пуассона.

Если $g(x, y) \equiv 0$, то в этом случае уравнение Пуассона называется *уравнением Лапласа*.

3.1 Найдите все производные второго порядка от следующих функций:

$$1) z = x + y.$$

$$2) z = \frac{1}{x + y}.$$

$$3) z = \ln(x + y).$$

$$4) z = e^{1+xy}.$$

$$5) z = \log_5 \left(\frac{x}{x + y} \right).$$

$$6) z = \frac{\arctg(xy)}{\sin(1 + xy)}.$$

$$7) z = \frac{e^{-4x}}{\cos(x)}.$$

$$8) z = \frac{\tg(7y + 1)}{\cos(4y)}.$$

$$9) z = (1 - x)\sqrt{1 + xy}.$$

$$10) z = \arctg(xy^7).$$

$$11) z = \frac{1 + \cos(1 - xy)}{\ln(1 - xy)}.$$

$$12) z = \frac{1 + x \sin(y)}{1 - xy}.$$

$$13) z = 1 - x \tg \left(\frac{x}{y} \right).$$

$$14) z = \frac{1 - x}{1 + e^{5y}}.$$

$$15) z = (1 + \sin(7x + y))\sqrt{y - x}.$$

$$16) z = (1 - x)\sin(3x - 5y).$$

$$17) z = x - 3\frac{x}{y}.$$

$$18) z = x^2 - 4y^5\sqrt{x + y}.$$

$$19) z = sh(x - y).$$

$$20) z = 4ch(xy).$$

3.2 Пользуясь результатами упражнения 3.1, проверьте справедливость равенства $z_{xy} = z_{yx}$.

3.3 Используя результаты упражнения 3.1, вычислите оператор Лапласа от функций z (т.е. $\nabla^2 z$), перечисленных в упражнении 3.1.

3.4 Являются ли следующие функции решениями уравнения Лапласа?

1) $z = x + y$.

2) $z = xy$.

3) $z = \ln(x^2 + y^2)$.

4) $z = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$.

5) $z = \frac{x}{x^2 + y^2}$.

6) $z = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$.

§4 Дифференцирование сложных функций

Если $u = f(x, y)$ - дифференцируемая функция переменных x, y , которые сами по себе являются дифференцируемыми функциями независимой переменной t :

$$x = j_1(t), \quad y = j_2(t),$$

то производная сложной функции $u = f(j_1(t), j_2(t))$ вычисляется по формуле

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

В частности, если t совпадает, например, с переменной x , то “полная” производная функции u по x равна

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dx}.$$

4.1 Найти $\frac{dz}{dt}$, если

1) $z = e^{2x-3y}$, где $x = \operatorname{tg} t$, $y = t^2 - t$.

2) $z = x^y$, где $x = \ln t$, $y = \sin t$.

3) $z = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$, где $x = e^{2t} + 1$, $y = e^{2t} - 1$.

$$4) z = \frac{y}{x}, \text{ где } x = e^t, y = \ln t.$$

$$5) z = (e^x + e^y), \text{ где } x = \sin(3t-1), y = e^t.$$

$$6) z = \operatorname{tg}(xy), \text{ где } x = \frac{1-t}{1+t}, y = \cos(2t).$$

$$7) z = \arcsin(x^2 - y), \text{ где } x = \frac{1-t}{1+e^t}, y = e.$$

$$8) z = \frac{1-x}{\lg x}, \text{ где } x = e^{2t} + 1, y = \ln t.$$

$$9) z = \arcsin(1-xy), \text{ где } x = \sin(3t-1), y = e^{2t} - 1.$$

$$10) z = \frac{1 - \ln(x+y)}{xy}, \text{ где } x = e^t, y = \ln t.$$

$$11) z = \frac{e^{xy}}{x-y}, \text{ где } x = \frac{1-t}{1+t}, y = \ln t.$$

$$12) z = \sqrt{xy - y^2}, \text{ где } x = \sin(3t-1), y = \frac{1-3t}{\cos(t)}.$$

§5 Замена переменных в дифференциальных выражениях

Пример 2. Требуется преобразовать уравнение

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0, \text{ полагая } x = \cos t.$$

Находим:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{-\sin(t)},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t * \frac{d^2 y}{dt^2} + \cos t * \frac{dy}{dt}}{\sin^2 t * (-\sin t)} = \frac{1}{\sin^2 t} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{\cos t}{\sin^3 t} \frac{dy}{dt}.$$

Подставим полученные выражения производных в данное уравнение и заменим x на $\cos t$:

$$(1 - \cos^2 t) \left(\frac{1}{\sin^2 t} \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{\cos t}{\sin^3 t} \frac{dy}{dt} \right) - \cos t \left(-\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt} \right) = 0.$$

или $\frac{d^2 y}{dt^2} = 0.$

5.1 Преобразовать уравнение

1) $x^4 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x^3 \frac{dy}{dx} - y = 0$, полагая $x = \frac{1}{t}$.

2) $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2x}{1+x^2} \frac{dy}{dx} + \frac{y}{(1+x^2)^2} = 0$, полагая $x = \operatorname{tg} t$.

3) $x \frac{dy}{dx} + x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = 1$, полагая $x = e^t$.

4) $2 \frac{dy}{dx} + 4(1+x) \frac{d^2 y}{dx^2} = \sqrt{1+x}$, полагая $x = t^2 - 1$.

5) $-2 \sin x * \cos x \frac{dy}{dx} + \cos^2 x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos^2 x}$, полагая $x = \operatorname{arctg} t$.

§6 Дифференциалы первого порядка функций 2-х переменных

В каждой точке, где справедливо равенство

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + A\Delta x + B\Delta y + C(\Delta x)^2 + D\Delta x\Delta y + E(\Delta y)^2 + \dots,$$

в котором $\Delta x = x - x_0 = dx$, $\Delta y = y - y_0 = dy$, дифференциал функции f первого порядка равен $df = A\Delta x + B\Delta y$.

Дифференциалом функции 1-го порядка называют линейную часть ее приращения.

Дифференциал функции первого порядка df может быть вычислен по формуле

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

Свойства дифференциала:

- $d(f + g) = df + dg$,
- $d(kf) = k df$, где $k - const$,
- $\int df = f + c$, где c – неопределённая константа.

6.1 Вычислите дифференциалы первого порядка следующих функций:

1) $z = e^{2x-3y}$.

2) $z = x^y$.

3) $z = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right)$.

4) $z = \frac{y}{x}$.

5) $z = (e^x + e^y)$.

6) $z = \operatorname{tg}(xy)$.

7) $z = \frac{e^{xy}}{x-y}$.

8) $z = \frac{1-x}{\lg x}$.

9) $z = \arcsin(1-xy)$.

10) $z = \frac{1-\ln(x+y)}{xy}$.

11) $z = \arcsin(x^2 - y)$.

12) $z = \sqrt{xy - y^2}$.

13) $z = x + y$.

14) $z = xy$.

15) $z = \ln(x^2 + y^2)$.

16) $z = \frac{x}{x^2 + y^2}$.

17) $z = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$.

18) $z = \log_5\left(\frac{x}{x+y}\right)$.

19) $z = \frac{\operatorname{arctg}(xy)}{\sin(1+xy)}$.

20) $z = \frac{e^{-4x}}{\cos(x)}$.

21) $z = (1-x)\sqrt{1+xy}$.

22) $z = (1+x)\sqrt{1-xy}$.

Дифференциальное выражение $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ является *полным дифференциалом*, если существует такая функция $z(x,y)$, дифференциал которой $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ совпадает с данным выражением.

Для того чтобы выражение $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ было полным дифференциалом, необходимо и достаточно соблюдение условия Римана $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

6.2 Проверьте, что полными дифференциалами будут следующие дифференциальные соотношения.

- 1) $dz = \frac{2x dx}{1+y^2-2x^2y+x^4} - \frac{dy}{1+y^2-2x^2y+x^4}$.
- 2) $dz = \frac{(0.5-\sqrt{x+y^2})dx}{x+y^2-x\sqrt{x+y^2}} + \frac{ydy}{x+y^2-x\sqrt{x+y^2}}$
- 3) $dz = \frac{dx+3dy}{\sqrt{1-x^2-6xy-9y^2}}$.
- 4) $dz = \frac{1}{1+xy} \sqrt{\frac{y}{x}} dx + \frac{1}{1+xy} \sqrt{\frac{y}{x}} dy$.
- 5) $dz = \cos(y+\sin x)(\cos x dx + dy)$.
- 6) $dz = 3e^{3x} \sin y dx + e^{3x} \cos y dy$.
- 7) $dz = (e^x + 1) dx$.
- 8) $dz = (2x - 15x^4 y) dx + (1 - 3x^5) dy$.
- 9) $dz = \frac{(3x+y)dx + xdy}{2\sqrt{x+y}}$.
- 10) $dz = \frac{e^x dx + dy}{e^x + y}$.

§7 Дифференциалы функций высших порядков

Дифференциал m -го порядка функции $z = f(x, y)$, где x, y - независимые переменные, выражается символьной формулой

$$d^m z = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^m z,$$

которая формально раскрывается по биномиальному закону.

Например, в случае функции $z = f(x, y)$ двух независимых переменных x и y для дифференциалов 2-го и 3-го порядков справедливы формулы

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2,$$

$$d^3z = \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} dx^3 + 3 \frac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3 \frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} dx dy^2 + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} dy^3.$$

7.1 Найти d^2z следующих функций:

1) $z = \frac{x}{x^2 + y^2}.$

2) $z = \frac{y}{x}.$

3) $z = \operatorname{tg}(xy).$

4) $z = x^y.$

5) $z = \frac{e^{xy}}{x-y}.$

6) $z = \frac{e^{-4x}}{\cos(x)}.$

7.3 Найти d^3z следующих функций:

1) $z = \ln(x+y).$

2) $z = \sin(xy).$

3) $z = e^{xy}.$

4) $z = x - y.$

5) $z = \frac{1}{xy-1}.$

6) $z = \frac{x}{y-1}.$

7) $z = x^7 y^3 - xy^5.$

8) $z = \cos(x+y).$

9) $z = e^{xy}.$

10) $z = e^x \cos(xy).$

11) $z = \ln(x+e^y).$

12) $z = \ln(x+e).$

13) $z = \frac{3x^2 y - xy^7}{x}.$

14) $z = \frac{xy + e^x y}{y}.$

15) $z = \frac{1+x}{y}.$

16) $z = \frac{1-x}{e^y}.$

17) $z = \frac{1+x^2}{y}.$

18) $z = \frac{1+x}{e^y}.$

§8 Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена

Если функция z дифференцируема $m+1$ раз в некоторой окрестности точки P_0 , то для всякой точки P ,

принадлежащей этой окрестности справедлива *формула Тейлора*:

$$z|_p = z|_{p_0} + \frac{dz|_{p_0}}{1!} + \frac{d^2 z|_{p_0}}{2!} + \dots + \frac{d^n z|_{p_0}}{n!} + \dots$$

Для случая функции двух переменных, *формула Тейлора* записывается следующим образом:

$$\begin{aligned} f(x, y) \approx & f(x_0, y_0) + (f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)) + \\ & + 0.5 * (f''_{xx}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2f''_{xy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + f''_{yy}(x_0, y_0)(y - y_0)^2) + \\ & + \frac{1}{6} * (f'''_{xxx}(x_0, y_0)(x - x_0)^3 + 3f'''_{xxy}(x_0, y_0)(x - x_0)^2(y - y_0) + \\ & + 3f'''_{xyy}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0)^2 + f'''_{yyy}(x_0, y_0)(y - y_0)^3) + \\ & \dots + \frac{1}{m!} \left((x - x_0) \frac{\partial}{\partial x} + (y - y_0) \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0). \end{aligned}$$

В частном случае $x_0 = 0, y_0 = 0$, получаем *формулу Маклорена*.

8.1 Разложить следующие функции в ряд Тейлора в окрестности точки (2,1) вплоть до второго порядка включительно:

1) $z = x^3 - 5x^2 - xy + y^2 + 10x + 5y - 4$.

2) $z = xy^2$.

3) $z = -x^2 + 2xy + 3y^2 - 6y - 4$.

4) $z = y/x$.

5) $z = \ln(xy + z^2)$.

6) $z = x^y$.

7) $z = \frac{1 - xy}{x}$.

8) $z = 1 - xy^5 - x^{-2}y$.

9) $z = e^x y - x^2 y$.

$$10) \quad z = \frac{1-xy}{e^y}.$$

8.2 Разложить следующие функции в ряд по формуле Маклорена вплоть до третьего порядка включительно:

$$1) \quad z = e^y \cos x.$$

$$2) \quad z = \sin x \cos y.$$

$$3) \quad z = \ln(xy+1).$$

$$4) \quad z = \ln(1+x^2+y^2).$$

$$5) \quad z = \operatorname{arctg}(1+xy).$$

$$6) \quad z = \operatorname{arctg}(1+x+y).$$

§9 Экстремумы функций двух переменных

Говорят, что функция f достигает *локального максимума* в точке Q_0 , если существует такая ε -окрестность точки Q_0 , для всех точек которой, значение функции в точке Q_0 будет наибольшим. Для любой точки Q_1 из этой окрестности, не совпадающей с Q_0 , должно выполняться строгое неравенство $f|_{Q_0} > f|_{Q_1}$.

Говорят, что функция f достигает *локального минимума* в точке Q_0 , если существует такая ε -окрестность точки Q_0 , для всех точек которой, значение функции в точке Q_0 будет наименьшим. Для любой точки Q_1 из этой окрестности, не совпадающей с Q_0 , должно выполняться строгое неравенство $f|_{Q_0} < f|_{Q_1}$.

Если функция достигает максимума или минимума в точке Q_0 , то точка Q_0 называется *точкой экстремума*.

Необходимое условие экстремума. Если дифференцируемая функция f достигает локального экстремума в точке Q_0 , то частная производная 1-го

порядка функции f в точке Q_0 по любому переменному равна нулю или не существует.

Достаточное условие экстремума функции двух переменных. Пусть частная производная 1-го порядка функции f в точке $Q_0(x_0, y_0)$ по любому переменному равна нулю. Введём обозначения: $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$, $\Delta = AC - B^2$. Тогда:

- 1) Если $\Delta > 0$ и $A < 0$ (или $\Delta > 0$ и $B < 0$), то функция имеет в точке $Q_0(x_0, y_0)$ локальный максимум.
- 2) Если $\Delta > 0$ и $A > 0$ (или $\Delta > 0$ и $B > 0$), то функция имеет в точке $Q_0(x_0, y_0)$ локальный минимум.
- 3) Если $\Delta < 0$, то экстремум в точке $Q_0(x_0, y_0)$ отсутствует.
- 4) Если $\Delta = 0$, то требуется дополнительное исследование.

9.1 Пользуясь определением локальных максимума и минимума функции в точке, исследовать на экстремум следующие функции:

- 1) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
- 2) $z = |x| + |y|$.
- 3) $z = |x + y|$.
- 4) $z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.
- 5) $z = \frac{1}{|x| + |y| + 1}$.
- 6) $z = |x| - |y|$.

9.2 Пользуясь достаточным условием экстремума функции двух переменных, исследовать на экстремум:

- 1) $z = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$.
- 2) $z = xy^2(1 - x - y)$ ($x > 0, y > 0$).
- 3) $z = x^2 + y^2 - 2\ln x - 18\ln y$,
($x > 0, y > 0$).
- 4) $z = xy + \frac{50}{x} + \frac{20}{y}$ ($x > 0, y > 0$).
- 5) $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.
- 6) $z = 3x^2 - x^3 + 3y^2 + 4y$.
- 7) $z = 2x^3 - xy^2 + 5x^2 + y^2$.
- 8) $z = (2x^2 + y^2)e^{-(x^2 + y^2)}$.

§10 Условный экстремум функций двух переменных

Пусть требуется найти условный экстремум функции $z = f(x, y)$, при условии, что x и y удовлетворяют уравнению связи $j(x, y) = 0$. Функция Лагранжа в этом случае имеет вид:

$$L(x, y, l) = f(x, y) + lj(x, y).$$

Точка условного экстремума находится при этом из условий:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \quad j(x, y) = 0.$$

Точка условного экстремума является точкой максимума, если вычисленный в этой точке определитель

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & j'_x & j'_y \\ -j'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ j'_y & L''_{xy} & L''_{yy} \end{vmatrix}$$

удовлетворяет условию $\Delta < 0$.

Если $\Delta > 0$, то точка условного экстремума является точкой минимума.

10.1 Найти условные экстремумы следующих функций:

1) $z = x^2 + y^2 - xy + x + y - 4$

при $x + y + 3 = 0$.

2) $z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ при $x + y = 2$.

3) $z = \frac{x - y - 4}{\sqrt{2}}$ при $x^2 + y^2 = 1$.

4) $z = xy^2$ при $x + 2y = 1$.

5) $z = 2x + y$ при $x^2 + y^2 = 1$.

6) $z = x^2 + y^2$ при $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

7) $z = xy^3$

8) $z = x + 2y$ при $x^2 + y^2 = 5$.

при $x+2y=12$ ($x>0, y>0$).

8) $z = x - y^3$ при $x+2y=0$.

9) $z = x+2y$ при $x^2 - y^2 = 5$.

§11 Наибольшее и наименьшее значения функции

Если функция дифференцируема в ограниченной области и непрерывна на границе этой области, то она достигает своего наибольшего (наименьшего) значения или в точке экстремума, или на границе области.

11.1 Найти наибольшее значение функции z в области Ω :

1) $z = x^2 + y^2 - xy - x - y, \Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3\}$.

2) $z = xy, \Omega = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$.

3) $z = xy^2, \Omega = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$.

4) $z = \sin x + \sin y, \Omega = \{0 \leq x \leq p/2, 0 \leq y \leq p/2\}$

5) $z = \sin x + \sin y + \sin(x+y), \Omega = \{0 \leq x \leq p/2, 0 \leq y \leq p/2\}$

6) $z = \sin x + \cos y + \cos(x-y), \Omega = \{0 \leq x \leq p/2, 0 \leq y \leq p/2\}$

11.2 Представить положительное число a в виде произведения четырёх положительных сомножителей так, чтобы сумма их обратных величин была наименьшей.

11.3 Внутри четырёхугольника найти точку, сумма квадратов расстояний которой от вершин была бы наименьшей.

11.4 В полушар радиуса R вписать прямоугольный параллелепипед наибольшего объёма.

11.5 Из всех треугольников с основанием b и углом a при вершине найти треугольник с наибольшей площадью.

11.6 Около данного квадрата описать квадрат наибольшей площади.

11.7 Из всех эллипсов, у которых сумма осей постоянна и равна m , найти наибольший по площади.

11.8 В круг вписать треугольник, сумма квадратов сторон которого наибольшая.